



Racumin[®]
FOAM 

Contacto fatal



Saúde Pública



Vantagens

- Rodenticida anticoagulante de contacto.
- Racumin Foam garante um eficiente controlo de roedores, graças à sua ação complementar aos iscos.
- Os efeitos duradouros da espuma garantem proteção durante um período mínimo de duas semanas.
- Eficaz, mesmo que o roedor não seja atraído pelo isco, graças à sua ação de contacto.
- Pode ser utilizado em zonas sensíveis (por exemplo, sistemas de ar condicionado, etc.).

Áreas de utilização

Espaços interiores, tais como no interior edifícios, habitações, infraestruturas de saneamento, explorações pecuárias, etc.

Dose e modo de utilização

Antes de aplicar, verifique que a embalagem está à temperatura ambiente e agite-a vigorosamente até ouvir a bola misturadora no seu interior. Aplique pressionando a válvula do aerossol, dirigindo a espuma às cavidades, buracos, tocas e/ou trilhos utilizados pelos roedores, em locais inacessíveis a crianças e animais domésticos ou outros.

Ratazanas: 20 a 30 g de espuma (bola com 11 cm de diâmetro)

Ratos: 4 a 30 g (bola com 6 cm de diâmetro)

Aplique a dose indicada por buraco / trilho dos roedores. A mesma quantidade pode igualmente ser aplicada repartida em porções de menor dimensão ao longo de cada trilho. Não tapar as entradas dos trilhos dos roedores com a espuma, por forma a que estes continuem a percorrer os locais tratados. Dependendo das condições de temperatura e humidade, a espuma persiste entre 7 a 12 dias.

Espetro de ação

Rodenticida de contacto contra ratazanas (*Rattus norvegicus*), ratos domésticos (*Mus musculus*) e rato preto (*Rattus rattus*).

Caraterísticas técnicas:

Composição e formulação:	Aerossol (AE) Cumatetraillo 0,4 %
Classificação toxicológica:	Aerossóis inflamáveis: Categoria 1 Irritação ocular: Categoria 2
Classificação ambiental:	Sem classificação
Apresentação:	500 ml
Prazo de segurança:	Não aplicável
Número de registo:	PT/DGS ARMPB-19/2014

